




Prova non
estratta
Jean Protocol

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

32

PROVA SCRITTA N. 1

Disturbo da uso di oppiacei: diagnosi e terapia farmacologica





Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Prova non
estrate


CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

33

PROVA SCRITTA N. 2

Disturbo da uso di alcol: diagnosi e terapia farmacologica





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

34

PROVA SCRITTA N. 3

Disturbo da uso di cocaina: diagnosi, comorbidità e terapie farmacologiche





Prova esatta
Deha law

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA PRATICA N. 1

35

Caso 1: Donna di 52 anni con richiesta volontaria di presa in carico per alcol

Familiarità per disturbi tiroidei, diabete, ipertensione ed ipercolesterolemia (mamma). Non familiarità per disturbi psichici. Nonno e padre con disturbo da uso di alcol.

8 anni di studi (media inferiore). Attualmente casalinga ma lavora anche come colf. La sig.ra Rota ha due figli di 14 e 11 anni e è sposata da 11 anni. Si sta separando dal marito.

Due aborti spontanei dopo il primo figlio e dopo la seconda figlia. Buon appetito, alimentazione irregolare con abbuffate e digiuni. Qualche episodio di vomito autoindotto. Eupeptica. Alvo regolare, diuresi fisiologica. Sonno caratterizzato da risveglio precoce

Nel 2003 trattata per attacchi di panico dal MAP con BDZ (Lexotan 15-20 gtt/die), 2011 tiroidectomia preventiva per riscontro di microcarcinoma. In terapia con Eutirox 150 microgr./die.

Sigarette dai 20 anni, fuma attualmente 20 sigarette/die. Ha interrotto almeno 10 volte nella sua vita con il periodo più lungo durante e dopo la prima gravidanza di quasi otto anni.

Alcol: consumo ad alto rischio dai 30 anni. Nell'ultimo mese 3-4 drinking days per settimana con consumo di 7-8UA/episodio.


Nega uso di qualunque altra sostanza nella sua vita.

Esami tossicologici

Matrice cheratinica (capello 6 cm) e matrice urinaria negativi ad ETG
MCV, ALT, AST gammaGT e CDT nella norma.

Domande:

1. Sospetto diagnostico
2. Ulteriori accertamenti diagnostici
3. Ipotesi terapeutica





Prova non eshot
Papa Giovanni

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA PRATICA N. 2

36

CASO CLINICO 2 : Donna di 47 anni con richiesta volontaria di presa in carico

Uso di oppiacei, eroina, dall'età di 18 aa per via endovenosa, nell'ultimo mese con frequenza quotidiana.

Uso di cocaina dall'età di 38 aa, anch'essa per via endovenosa con frequenza plurisettimanale. Riferita HIV e HCV positività all'età di 40 anni.

Lamenta ansia e sensazione di freddo. Obiettivamente scadute condizioni generali, vigile, lucida, collaborante, cute e mucose pallide, orripilazione ++, sudorazione, sbadigli, pupille midriatiche bilaterale normoreagenti allo stimolo luminoso.

Esami tossicologici

Matrice urinaria e cheratinica:

Test di screening positivo per oppiacei, metadone e cocaina.

Test di conferma positivo per morfina, 6 acetil-morfina, metadone, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP), cocaina e benzoilecgonina,

Domande:

1. Sospetto diagnostico
2. Ulteriori accertamenti diagnostici
3. Ipotesi terapeutica





Prove non esatte
Sehe Jani

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA PRATICA N. 3

37

CASO CLINICO 3

Uomo di 31 anni, si presenta volontariamente per uso di cocaina.

Puntuale, lucido ed orientato, disponibile al colloquio, tono dell'umore modulabile. Primo accesso ai servizi di cura, uso di cocaina settimanale per via inalatoria, consumo di alcol ad alto rischio concomitante all'uso di cocaina, fuma 40 sigarette/die solo quando consuma cocaina. Attività sportiva intensa (pugilato) a seguito della quale ha una sordità evidente di origine traumatica. Lavora come barista, attualmente fermo per le restrizioni anti covid. Vive con la partner a suo dire non utilizzatrice di sostanze. Familiarità negativa per altri disturbi psichici, uno zio materno con disturbo da uso di alcol. Attualmente nessuna terapia farmacologica in corso.

Tabacco dai 12 anni, rubando le sigarette alla mamma, dai 14 regolarmente perché il comportamento era tollerato dalla madre. Dalla stessa età cannabis in contesto amicale ("ragazzi più grandi, all'epoca sono cresciuto come un randagio"). Primo contatto con la **cocaina** a 14 anni, "la sensazione più bella che avessi mai provato, rilassamento mentale, loquacità... ma deluso perché l'effetto era durato poco". Dai 18 ai 24 ne interrompe il consumo, spaventato da un attacco di panico insorto durante un episodio di binge cocainica. A 24 anni riprende il consumo di cocaina ma cambiando progressivamente il contesto: dalla condivisione con il gruppo amicale al consumo solitario. Dai 16 anni inizia a consumare anche **ecstasy** ed **anfetamina**, quest'ultima apprezzata per gli effetti positivi (lucidità mentale, miglioramento delle prestazioni intellettive e manuali, energia vitale) e a lungo termine. Contesto familiare problematico: "Non ho vissuto una bella infanzia" con episodi di "violenza ingiustificata" del padre nei suoi confronti e del clima "conflittuale e di ansia" in cui è vissuto. Il padre è descritto come un uomo violento ed imprevedibile, una madre iperprotettiva, forte, molto "stravagante" e occupata a tempo pieno nell'attività in proprio (bar). Gli anni scolastici sono stati caratterizzati da notevoli difficoltà sia nell'apprendimento che nella relazione con i pari.

Esami tossicologici

Pelo toracico positivo per cocaina (test di conferma cocaina 72 ng/mg, benzoilecgonina 25ng/mg) ed ETG (> 100 pg/mg)

Urine positive per cocaina (test di conferma > 1000 ng/ml). ETG nelle urine negativo.

Domande:

1. **Sospetto diagnostico**
2. **Ulteriori accertamenti diagnostici**
3. **Ipotesi terapeutica**



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 1

Esami tossicologici – matrici utilizzate, tipologia di analisi e significato






CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 2

La comorbilità psichiatrica – principali quadri associati al disturbo da uso di
sostanze






CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 3

La comorbilità internistica – principali quadri associati all'uso di sostanze





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 4

In un consumatore di sostanze quali esami ematici prescriveresti in fase di
valutazione iniziale e perché



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 5


Terapia farmacologica del tabagismo



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 6

La riduzione del danno: definizione e azioni






CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 7

Disturbo da gioco d'azzardo – diagnosi, comorbilità e terapia farmacologica





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 8

Quali sono le normative specifiche nella prescrizione di farmaci oppioidi nel
trattamento del disturbo da uso di oppiacei





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 9

Il trattamento dell'overdose da oppiacei





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 10

Terapia farmacologica dell'intossicazione acuta da cocaina



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 11

Indicatori di rischio aggiuntivo in un consumatore di oppiacei





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALL'UOC DIPENDENZE

PROVA ORALE N. 12

Terapie farmacologiche per il disturbo da uso di alcol

