

 <p>Regione Lombardia</p> <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URINE per ricerca di *Schistosoma haematobium (bilarziosi)*

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?

3 contenitori sterili, a bocca larga con tappo a vite, forniti dal Laboratorio/Centro Prelievi.

COME FARE LA RACCOLTA DELL'URINA?

La raccolta del campione deve avvenire al **Laboratorio/Centro Prelievi tra le ore 11.30 e le ore 12.30**, senza aver urinato da almeno 3 ore.

Il paziente sarà invitato, prima della raccolta, a salire una rampa di scale o a fare piegamenti sulle ginocchia o saltelli.

Dovrà quindi raccogliere le urine in tre barattoli diversi:

- 1° barattolo: per la raccolta del primo mitto;
- 2° barattolo: per la raccolta del mitto intermedio;
- 3° barattolo: per la raccolta dell'ultima parte del mitto.

In totale, devono essere raccolti circa 50 mL di urina.